

注意報 要周知

奈病防第10号
令和3年7月28日

関係機関長 殿
病虫害防除員 殿
調査員・情報員 殿
農業資材販売等関係者 殿

奈良県病虫害防除所長

病虫害発生予察注意報の送付について

このことについて、以下の通り発表しました。

周知を徹底するとともに、適正・安全な防除について御指導をお願いします。

令和3年度病虫害発生予察注意報第3号

作物名：水稲 病虫害名：トビイロウンカ 対象地域：主に平坦地域
(5月下旬以降移植の作型)
発生時期：早い 発生量：多い 対象時期：8月

1 注意報発表の根拠

- 6月中下旬に、昨年と同程度の多飛来を確認しました。
- 7月中下旬に実施した巡回調査において、平坦地域の水田の約2割で発生を確認しました。

2 防除上の注意事項

- 梅雨明け後の高温による急増が予想されます。基幹防除の適期(第2世代若齢幼虫期)は8月上旬と予想されますので、下表を参考に確実な防除を行って下さい。
- 液剤散布により防除を行う場合は、株元まで届くように薬剤を散布して下さい。

3 農薬安全使用上の注意事項

- 農薬を使用する際には、ラベルに記載された登録の有無、収穫前使用日数や使用回数を確認するとともに、止水期間を遵守して下さい。
- 水面施用粒剤や豆つぶ剤を使用する場合は、湛水してから処理し、散布後7日間は落水、かけ流しをしないで下さい。
- ほ場周辺への薬剤飛散防止に努めて下さい。風の強い日は散布を控え、散布する場合であっても風向きに注意し、収穫期に近い他作物へ飛散しないようにして下さい。

表 トビイロウンカの主な防除薬剤（令和3年7月7日現在の登録状況）

薬剤名	IRAC コード	希釈倍率または使用量	収穫前使用期間	使用回数
MR.ジョーカーEW	3A	2000倍	収穫14日前まで	2回以内
		16倍(無人ヘリ0.8L/10a)		
トレボンEW	3A	1000倍	収穫14日前まで	3回以内
トレボン乳剤		1000～2000倍		
スタークル/アルバリン粒剤 ※1	4A	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内
スタークル豆つぶ ※1		250～500g/10a		
エクシードフロアブル	4C	2000倍	収穫7日前まで	3回以内
		16倍(無人ヘリ0.8L/10a)		
エミリアフロアブル	-	1000倍	収穫7日前まで	2回以内
		8倍(無人ヘリ0.8L/10a)		

※1：使用上の注意に書かれた水深に注意する。

お問い合わせは
奈良県病害虫防除所 TEL. 0744-47-4481
 その他関連情報は以下をご覧ください
病害虫防除所ホームページ <http://www.jppn.ne.jp/nara/>
奈良県農薬情報システム（農作物病害虫・雑草防除指導指針）
<http://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/nara>
 pdf 冊子「奈良県における令和2年のトビイロウンカ多発について」を病害虫防除所ホームページに掲載しています。

