

注意報

令和4年 5月 30日
奈良県病害虫防除所長

令和4年度病害虫発生予察注意報第1号

病害虫名 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ・クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ)
作物名 ウメ・スモモ・モモ・ナシ・カキ・ブドウ・カンキツ

1. 対象地域 県下全域

2. 対象時期 5月～8月

3. 発生量 多い

4. 注意報発表の根拠

(1) チャバネアオカメムシの越冬量は、地点当たり平均 16.3 頭（平年値の 2.4 倍）で
あり、過去 10 年で 2 番目に多いです（図）。

(2) 5月下旬の巡回調査では、サクラ、クワへの寄生樹率は 87%、平均虫数は 3.9 頭と、
発生が多かった令和2年（3.8頭）と同等であり、今後果樹園への多飛来が予測され
ます。

(3) 一部地域の予察灯では、日当たり 100 頭を越える飛来が確認されています。

5. 防除上の注意事項

(1) カメムシの飛来は園地間差が大きいので、こまめに園地を見回ります。新しい被害
やカメムシを確認した場合は直ちに防除してください。

(2) 最低気温が高く、蒸し暑く感じる夜は飛来に注意が必要です。また、山際の園地や、
過去にカメムシ被害が多かった園地では特に注意してください。

(3) 飛来がない園での予防散布は効果が期待できません。逆に天敵の減少によってカイ
ガラムシ類、ハダニ類の増加につながるので控えてください。

(4) 黄色灯を設置している園地では早急に点灯してください。ただし、チャバネアオカ
メムシ以外には効果がないので、クサギカメムシやツヤアオカメムシが目立つ場合は

薬剤防除が必要です。

- (5) 電撃殺虫器、果樹園に面した蛍光灯などの光源は、カメムシを誘引するので消灯してください。
- (6) 5月～6月は、ウメ、スモモ、ナシおよびモモの幼果が被害を受けやすいです。ナシ、モモの有袋栽培では、袋かけを早めに終えましょう。 カキ園には6月下旬（幼果期）以降飛来が多くなります。 今後の予察情報に十分注意してください。
- (7) 農薬散布時には、隣接する農作物に飛散しないよう、十分注意するとともに、使用前にはラベルをよく読み、記載された使用条件を遵守してください。




図. チャバネアオカメムシの越冬量の年次変動

表. カメムシ類の主な防除薬剤

表 カメムシ類の主な防除薬剤

	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	系統名
ウメ	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内	
スモモ	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫3日前まで	3回以内	
モモ	アグロスリン水和剤	1000倍	収穫前日まで	2回以内	ピレスロイド系
	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	アドマイヤー顆粒水和剤	5000~10000倍	収穫3日前まで※	2回以内	
	モスピラン顆粒水溶剤	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内	ピレスロイド系
ナシ	アグロスリン水和剤	2000倍	収穫前日まで	5回以内	
	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	アドマイヤー顆粒水和剤	5000~10000倍	収穫3日前まで※	2回以内	
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内	ピレスロイド系
	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	
	アグロスリン水和剤	1000~2000倍	収穫前日まで	3回以内	
	MR.ジョーカー水和剤	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	
カキ	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫7日前まで	3回以内	ピレスロイド系
	アグロスリン水和剤	1000~2000倍	収穫前日まで	3回以内	
	MR.ジョーカー水和剤	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	フェニルピラゾール系
ブドウ	キラップフロアブル	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	
	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
カンキツ	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内	ネオニコチノイド系
	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	
	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	収穫前日まで	3回以内	ピレスロイド系
	アグロスリン水和剤	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	
	MR.ジョーカー水和剤	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	

※但し、露地栽培については発芽期から開花期を除く

登録内容は令和4年5月25日時点のものです。農薬使用前にはラベルをよく読んで、記載された使用条件を遵守してください。

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所

TEL. 0744-47-4481



その他関連情報は以下をご覧下さい

病害虫防除所ホームページ <http://www.jppn.ne.jp/nara/>

奈良県農薬情報システム（農作物病害虫・雑草防除指導指針）
<http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/nara>

