

注意報

令和 7 年 6 月 2 日

奈良県病害虫防除所長

令和 7 年度病害虫発生予察注意報第 1 号

病害虫名：オオタバコガ

作物名：ナス、トマト、キク等の野菜類・花き類

対象地域：奈良県全域 発生時期：早い 発生量：多い

1 注意報発表の根拠

- (1) 5 月 1 半旬より、性フェロモントラップへの多飛来が続いています (図)。
- (2) 5 月中旬の巡回調査では、キクでの発生圃場率が 20%でした (平年値 2%※過去 10 年間)。またイチゴでの発生も確認しています。
- (3) 近畿地方の 3 ヶ月予報 (5 月 20 日発表) では、6～8 月の気温は平年より高いと予想されています。
- (4) 平年よりも被害の初発が 1 ヶ月以上早く、例年にない時期の発生です。今後、野菜類・花き類での被害拡大が懸念されます。




図. 性フェロモントラップ誘殺数の推移 (桜井市池之内)

2 防除上の注意事項

- (1) オオタバコガは成虫が夜間に飛来し、新葉や蕾に 1 卵ずつ産みつけます。ふ化幼虫は、新葉や蕾から食害を始め、発育が進むと果実 (ナス、トマト)、結球部 (レタス)、茎 (トマト)、新芽 (キク) や花蕾 (キク、バラ) などに潜り込みます。幼虫による食害が発生していないかよく観察して、初期防除に努めます。
- (2) 病害虫防除所で実施した薬剤感受性検定では、近年の感受性低下は確認されていません。発生が見られた場合は、表を参考にして防除薬剤を選択してください。
- (3) 防除の前に、薬剤の登録内容をよく確認してご使用ください。

表. ナス、トマト、キクにおけるオオタバコガの主な防除薬剤

(令和7年5月27日現在の登録状況)

表にない作物は、作物ごとの登録の有無や内容をよく確認してご使用ください。

IRAC コード	薬剤名	ナス			トマト			キク		
		希釈 倍数 (倍)	収穫前 使用 日数	総使用 回数	希釈 倍数 (倍)	収穫前 使用 日数	総使用 回数	希釈 倍数 (倍)	使用 時期	総使用 回数
5	スピノエース 顆粒水和剤	5000	前日	2	5000	前日	2	2500 ～5000	発生初期	2
	ディアナSC	2500 ～5000	前日	2	2500 ～5000	前日	2	2500 ～5000	発生初期	2
6	アフーム乳剤	2000	前日	2	2000	前日	5	1000	発生初期	5
	アニキ乳剤	2000	前日	3	2000	前日	3	1000 ～2000	発生初期	6
18	ファルコン フロアブル	2000 ～4000	前日	2	2000 ～4000	前日	2		登録なし	
22A	トルネード エースDF	2000	前日	2	2000	前日	2	2000	発生初期	4
22B	アクセル フロアブル	1000 ～2000	前日	3	1000 ～2000	前日	3	1000 ～2000	発生初期	6
28	フェニックス 顆粒水和剤	2000 ～4000	前日	3	2000 ～4000	前日	2	2000	発生初期	4
	プレバソン フロアブル5	2000	前日	2	2000	前日	3		登録なし	
	ヨーバル フロアブル	2500 ～5000	前日	3	2500 ～5000	前日	3	2500 ～5000	発生初期	3
30	グレーシア乳剤	2000	前日	2	2000	前日	2	2000	発生初期	2

お問い合わせは

奈良県病害虫防除所

TEL. 0744-47-4481

その他関連情報は以下をご覧ください

病害虫防除所ホームページ

<https://www.pref.nara.jp/1557.htm>

奈良県農業情報システム（農作物病害虫・雑草防除指導指針）

<http://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/nara>